



Tabla de preparación de Neocate® Infant

Para padres y cuidadores*

20 kcal/fl oz 0.67 kcal/ml
(Dilución estándar)

Basado en un volumen inicial uniforme de agua:

Estas recetas comienzan con volúmenes exactos de agua a los que se agregan cucharas (scoops) niveladas sin presionar. Tenga en cuenta que los volúmenes finales son aproximados.

Neocate Infant está especialmente formulado para el manejo de la dieta de bebés con alergia a la leche de vaca, alergias a múltiples alimentos y afecciones GI y/o alérgicas relacionadas, incluidas FPIES, EGID, SBS, mala absorción[‡] y GER relacionado con alergias alimentarias.

Para alimentación oral y por sonda; no para uso parenteral.

Neocate® es una familia de alimentos médicos hipoalérgicos basados en aminoácidos. Neocate está diseñado para su uso bajo supervisión médica.

Volumen de agua [†]		Cantidad de polvo Neocate [‡]			Volumen final aproximado [†]	
fl oz	ml	cucharadas (scoops)	gramos	kcal	fl oz	ml
1.0	30	1	4.6	22.2	1.1	33
2.0	60	2	9.2	44	2.2	66
3.0	90	3	13.8	67	3.3	100
4.0	120	4	18.4	89	4.4	133
5.0	150	5	23.0	111	5.5	166
6.0	180	6	27.6	133	6.6	199
7.0	210	7	32.2	156	7.8	233
8.0	240	8	36.8	178	8.9	266
9.0	270	9	41.4	200	10.0	299
10.0	300	10	46.0	222	11.1	332
12.0	360	12	55.2	267	13.3	399
12.0	360	12	55.2	267	13.3	399
13.0	390	13	59.8	289	14.4	432
14.0	420	14	64.4	311	15.5	465
15.0	450	15	69.0	333	16.6	498
16.0	480	16	73.6	355	17.7	532
18.0	540	18	82.8	400	19.9	598
20.0	600	20	92.0	444	22.1	664
22.0	660	22	101	489	24.4	731
24.0	720	24	110	533	26.6	797
26.0	780	26	120	578	28.8	864
28.0	840	28	129	622	31.0	930
30.0	900	30	138	667	33.2	997
32.0	960	32	147	711	35.4	1063
34.0	1020	34	156	755	37.6	1129
36.0	1080	36	166	800	39.9	1196
38.0	1140	38	175	844	42.1	1262
40.0	1200	40	184	889	44.3	1329
50.0	1500	50	230	1111	55.4	1661
60.0	1800	60	276	1333	66.4	1993
70.0	2100	70	322	1555	77.5	2325
87.0	2610	LATA LLENA	400	1932	96.6	2900

Cómo prepararlo

Consulte la etiqueta de la lata para ver las instrucciones de preparación completas.

1. Lávese bien las manos y limpie el área de preparación. Vierta agua hervida fría en un biberón o recipiente esterilizado.



2. Agregue la cantidad requerida de polvo Neocate Infant DHA/ARA.



3. Tape el biberón o recipiente y agite bien hasta que el polvo se disuelva.



Nutricia recomienda usar agua hervida fría para la preparación y biberones esterilizados. Pregunte al equipo de cuidado del bebé si necesita usar agua hervida fría para mezclar y si necesita hervir (esterilizar) los biberones, las tetinas y los anillos antes de usarlos.

Información importante sobre la preparación

- UTILIZAR ÚNICAMENTE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA.
- Para obtener más información acerca del uso del producto, visite Neocate.com.
- Alimente inmediatamente O refrigere inmediatamente entre 35 y 40 °F (2-4 °C) y utilice en un plazo de 24 horas.
- Deseche la fórmula que quede en el biberón 1 hora después del inicio de la alimentación.
- No hierva la fórmula ni utilice un microondas para preparar o calentar la fórmula; pueden ocurrir graves quemaduras.

Almacenamiento

- Almacene la lata en un lugar fresco y seco (no en el refrigerador). No almacene a temperaturas extremas.
- Una vez abierta, vuelva a tapar la lata y úsela en el plazo de 1 mes.

Nutricia North America recomienda utilizar una balanza en gramos para lograr una mayor precisión.

Las cucharas (scoops) que proporciona Nutricia están validadas para su uso con fórmulas Nutricia, por lo que son preferibles a las medidas caseras.

* Para la seguridad del paciente, Nutricia les indica a los cuidadores que solicitan instrucciones de mezcla usando diluciones no estándar, o recetas que utilizan medidas caseras en lugar de una balanza o las cucharas (scoops) proporcionadas, que consulten con su equipo médico para obtener orientación.

[†] Esta tabla supone que 1 fl oz = 30 ml. Los volúmenes de agua son exactos, pero es posible que el volumen final de la fórmula preparada varíe ligeramente.

[‡] Las diluciones son más precisas cuando se pesa el polvo en lugar de medirlo con cucharadas. Las cucharadas (scoop) deben estar niveladas, pero sin presionar. Una (1) cucharada (scoop) nivelada sin presionar contiene 4.6 gramos de polvo y aporta 22.2 kcal. Un (1) gramo aporta 4.83 kcal y sustituye ~0.70 ml de agua.

[§] La mala absorción describe una reducción de la capacidad del cuerpo para absorber y/o digerir suficientemente grasas, proteínas, carbohidratos y otros nutrientes de la dieta para satisfacer las necesidades nutricionales.

Última actualización: 30 de agosto de 2024

Si tiene preguntas, comuníquese con:

NutritionServices@Nutricia.com

(800) 365-7354

neocate.com/shop/hypoallergenic-formula-and-products/infant-dha-ara

